

زعفران کاران عزیز، برای نتیجه بهتر از کاشت زعفران به موارد زیر توجه نمایید:

❖ روش کاشت به صورت کرتی توصیه می شود (شخم، کلوخه شکنی و کرت بندی).

❖ کشت پیازهایی با وزن تقریبی ۸ گرم.

❖ میزان پیاز لازم برای هر جریب ۲۵۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم است.

❖ پیازها قبل از کاشت بوسیله سموم قارچ کش و کنه کش، ضد عفونی شوند.

❖ عمق کاشت پیاز ۲۰ سانتی متر است.

❖ زمان کاشت پیاز زعفران، در شهرستان برخوار، نیمه دوم شهریور ماه می باشد.

صد عفونی پیاز زعفران قبل از کاشت:

قارچ کش ایپردیون + کاربندازیم (رورال) و یا تیوفانات متیل (توپسین) بمیزان ۳۰ گرم و کنه کش برومپروپیلات (نتورون) و یا فن پروکسی مایت (ارتوس) بمیزان ۳۰ گرم در ۱۰ لیتر آب) بمدت ۳۰-۲۰ دقیقه.

آبیاری

نیاز آبی زعفران حدود ۳۰۰۰ متر مکعب می باشد.

۱. رشد زعفران با اولین آبیاری مزرعه در پاییز آغاز می شود.

۲. آبیاری دوم، یک ماه پس از آبیاری اول و بعد از برداشت گل ها

۳. آبیاری سوم، پس از وجین علف های هرز انجام شود.

۴. آبیاری چهارم، پایان فصل رویش (قبل از دهه اول اردیبهشت).

کوددهی

۱. قبل از کاشت: مقدار کود دامی پوسیده گاوی به مقدار ۳۰ تا ۲۰۰ تن در هکتار می باشد.

۲. محلولپاشی یک بار در اسفندماه با کود مایع مخلوط (N-P-K) به همراه کلانهای آهن، روی، منگنز و مس) با غلظت ۷ در هزار .

۳. ۱۰۰ کیلو اوره در هکتار پس از برداشت گل.

۴. کودهای شیمیایی فسفات و پتاسه حدود ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار (با توجه به آزمایش خاک).

علف هرز

از کاربرد علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) جهت کنترل علف های هرز در مزارع زعفران جدا خودداری گردد.

در بهار در مرحله ۴-۲ برگ علف های هرز باریک برگ از علف کش هالوکسی فوپ آرمیتیل (سوپر گالانت) بمیزان ۱ لیتر در هکتار سمپاشی نمود .

جهت حفظ مرغوبیت رنگ زعفران، برداشت گل ها صبح زود و به صورت گل نیمه باز و یا غنچه باشد توصیه می شود.